

Aves de la Laguna Escalera



Eusebio Gómez Reina, naturalista y ornitólogo aficionado, socio de la Sociedad Española de Ornitología, actual SEO/Birdlife, desde el año 1981. Colaborador de Agencia Estatal de Meteorología en el área de la Fenología, socio de los Grupos Ecologista Quercus y Jacaranda de El Rubio. Desde el año 1992 es anillador numerario y a partir de 1995 como anillador experto en el Grupo Ornitológico Zamalla de Sevilla adscrito a la Estación Biológica de Doñana.

Junto a sus nietos Elena y Pablo Baena Gómez llevan a cabo censos de las aves que se pueden observar en la laguna Escalera así como anillamientos y seguimientos en cajas nido.



Delegación de Medio Ambiente
Ayuntamiento de El Rubio

Aves de la Laguna Escalera – El Rubio
Eusebio Gómez Reina & Elena y Pablo Baena Gómez.



Vista de la Laguna Escalera con la población de El Rubio al fondo. Foto Eusebio Gómez.

Aves de la Laguna Escalera – El Rubio
Eusebio Gómez Reina & Elena y Pablo Baena Gómez.

La Laguna Escalera es una pequeña zona húmeda situada a unos 3,5 km de la localidad de El Rubio en el sureste de la provincia de Sevilla.

Tiene forma redondeada con un diámetro aproximado en su parte más ancha de 350mt, la zona encharcada ocupa unas 7,5 hectáreas de extensión y otras 3,5 hectáreas de zona de influencia.

Es una laguna de carácter estacional y que depende principalmente de las lluvias invernales, sus aguas son salinas y alcanzan una altura de 60-70 cm en años favorables.

Dada las características de sus aguas, la estacionalidad de las mismas y el uso para la agricultura en años secos, condicionan la vegetación y la fauna que en ella habitan.

La salinidad de sus aguas y su situación geográfica en las rutas migratorias entre Europa y África, convierten a este tipo de lagunas en un ecosistema de suma importancia para una gran variedad de especies y únicos dentro de nuestro continente.

Fotos, Textos y Dibujos.- Eusebio Gómez Reina.



Macho de Ánade real



Andarrios grande



Ánade friso



Chorlitejo chico



Cigüeñuela



Flamenco rosa




Cigüeña blanca



Gallineta

LAVANDERA BOYERA (*Motacilla flava*)



Paseriforme de unos 16-17 cm de longitud y 24-25 cm de envergadura, el plumaje de la subespecie que cría en esta zona tiene las partes superiores verdosas en el dorso y obispillo, alas negruzcas con franjas blancas. La cabeza es gris con garganta y cejas blancas y un antifaz oscuro en la cara y ojos. Las partes inferiores son amarillas en mayor o menor intensidad. Más común de paso pudiendo alguna pareja intentar reproducirse en la laguna. También se observan algunos ejemplares de otras subespecies europeas.


CARRICERO COMÚN (*Acrocephalus scirpaceus*)



Pájaro de unos 13 cm de longitud y 20 cm de envergadura. Macho y hembra tienen el mismo plumaje, las partes superiores son de color marrón oliváceo y las inferiores pardo ocráceo. Es común en la zona de Tarajes y Carrizos donde pueden llegar a reproducirse. Su canto se escucha desde abril hasta bien entrado el verano.


AVES INVERNANTES.- Son aquellas que podemos ver en la laguna los meses invernales, la gran mayoría vienen del norte y centro de Europa buscando alimento y clima más suave.

CUCHARA COMÚN (*Spatula clypeata*)



Especie de pato de 44-52cm de longitud y 75-80 cm de envergadura. El macho presenta un color verde brillante en la cabeza y cuello, pecho blanco con el vientre y flancos castaños, partes dorsales de tonos marrones. Las hembras son de tono parduzco. Es común aunque no abundante con algún intento de reproducción.

TARRO BLANCO (*Tadorna tadorna*)




Pato de 58-70 cm de longitud y 100-130 cm de envergadura. Ambos sexos son iguales, con la cabeza y cuello de color verde oscuro, resto del cuello y cuerpo blanco con ancho collar pardo rojizo y el dorso verde oscuro. Pico rojo con abultamiento solo el macho. Escaso que puede verse incluso en primavera aunque no confirmada su reproducción.

CORMORAN GRANDE (*Phalacrocorax carbo*)




De 80-100 cm de longitud y 135-155 cm de envergadura, el plumaje en general tanto el macho como la hembra, es negro con reflejos iridiscentes en sus partes superiores y una zona desnuda de plumas en la cara de color blanco. Es un visitante ocasional en la laguna, siempre en pequeño número y en invierno.

PATO COLORADO (*Netta rufina*)




Pato de unos 53-57 cm de longitud y 85-89 cm de envergadura. El macho tiene color rojizo en la cabeza y zona anterior del cuello con la parte posterior del mismo, la nuca, el pecho, banda central del vientre, zona de la cola y obispillo negros. El resto de las partes superiores son pardas con los flancos blancos. Las hembras tiene tonos más discretos y apagados. Es una especie invernante y en escaso número.

CHORLITEJO CHICO (*Charadrius dubius*)




Especie de limícola de 15-17 cm de longitud y 33-36 cm de envergadura. Ambos sexos presentan mismo plumaje, aunque la hembra en tono más apagado, en época de cría las partes superiores son de color marrón grisáceo con dos listas, blanca y negra a modo de collar. La cabeza de color blanco con una banda negra en la frente, color que se extiende por la cara a modo de antifaz y separada del píleo por una fina línea blanca. Partes inferiores blancas con collar negro. Especie común como reproductor que llega desde África en primavera.

CHORLITEJO PATINEGRO (*Charadrius alexandrinus*)




Limícola de 15-17 cm de longitud y 33-35 cm de envergadura. Sexos iguales aunque las hembras presentan tonos más apagados. Tienen las partes superiores de color pardo grisáceo con tonos rojizo en la nuca, la cabeza blanca con una mancha negra en la frente y antifaz estrecho del mismo color que llega hasta la nuca. Las partes inferiores son blancas con manchas negras en los lados del cuello a modo de medio collar. Especie escasa que llega en primavera con posibles intentos de reproducción.

PAGAZA PICONEGRA (*Gelochelidon nilotica*)




De 38-40 cm de longitud y 85-100 cm de envergadura, el plumaje en general tanto en macho como hembra es gris en el dorso, alas, obispillo y cola siendo estos dos últimos algo más claro. La cabeza presenta un capirote negro que se extiende hasta la nuca. Las partes inferiores son blancas, igual que la cara, pecho y lados del cuello. Es una especie que llega a finales de marzo-primeros de abril, es común y numerosa con intentos de reproducción.

CERCETA CARRETONA (*Spatula querquedula*)




Pato de unos 34-37 cm de longitud y 60-63 cm de envergadura. El macho tiene las partes superiores de color grisáceo con la cabeza y el pecho pardo estriado y una línea blanca a modo de ceja ancha. Las partes inferiores son blancuzcas en el vientre con los flancos rayados y la parte trasera parduzca. Las hembras son de color parduzco jaspeado con la ceja blanca menos marcada que el macho. Especie escasa, algunos años se ha visto la pareja durante la época de reproducción aunque no se ha podido confirmar la cría.

PORRÓN EUROPEO (*Aythya ferina*)




Especie de pato de 40-44 cm de longitud y 65-75 cm de envergadura. El macho tiene la cabeza y el cuello pardo rojizo con el pecho y parte trasera del cuerpo de color negro, el dorso, vientre y los flancos grisáceos. La hembra tiene la parte trasera del cuerpo de color rojizo, la cabeza y cuello cremosos. Es una especie escasa y esporádica observándose en periodo invernal.

AGACHADIZA COMÚN (*Gallinago gallinago*)



De 26-28 cm de longitud y 43-45 cm de envergadura. Sexos iguales. Tiene las partes superiores de color pardo rojizo y negro dando la apariencia de rayado. La cabeza parda presenta unas líneas claras y oscuras en el píleo y blancas por encima y por debajo de los ojos. Las partes inferiores son blancas rayadas de oscuro en los flancos y el pecho parduzco también rayado. Es una especie escasa y solo observa en invierno.

GAVIOTA SOMBRÍA (*Larus fuscus*)



De 50-55 cm de longitud y 130-150 cm de envergadura, el plumaje en general es igual tanto en machos como hembras, siendo aquel algo mayor de tamaño. El plumaje es gris pizarroso en el dorso y alas, teniendo estas las primarias negras, la cabeza y el resto de las partes inferiores son blancos. Es un ave abundante en invierno formando grandes grupos que se desplazan de unas lagunas a otras y a los vertederos donde principalmente buscan alimentos.

BISBITA PRATENSE (*Anthus pratensis*)



Pájaro de unos 14-15 cm de longitud y 24-25 cm de envergadura. Ambos sexos tienen el mismo plumaje, este tiene las partes superiores de color pardo rayado de estrías más claras y oscuras, la cabeza también parda y rayada con una fina línea blanca a modo de bigotera. Las partes inferiores son blancuzcas finamente rayadas con motas o manchas negruzcas. Es una especie invernante y antaño muy abundante que se conocen con el nombre popular de SORDILLAS.

AVOCETA (*Recurvirostra avosetta*)



Limícola de 42-45 cm de longitud y 70-75 cm de envergadura. El plumaje en general es igual en ambos sexos, de color blanco con el píleo y parte posterior del cuello negros, así como dos franjas del mismo color en el dorso y las primarias también negras. En las hembras el negro suele ser algo más apagado. Es un ave estival que llega por esta zona en marzo para reproducirse en la laguna, siempre que esta mantenga unos niveles hídricos aceptables.


ZARCERO BEREBER (*Iduna opaca*)



Pájaro de pequeño tamaño, de 12-14 cm de longitud y 20-21 cm de envergadura. Sexos iguales. El plumaje de las partes superiores es gris parduzco con obispillo verdoso y las inferiores blancuzcas. Es un ave estival que pasa el invierno en África y llega para reproducirse a primeros de abril, le gusta zonas con arbolado cercano a cursos o masas de agua siendo la laguna un lugar que reúne las características adecuadas para esta especie. La emigración al continente africano es en los meses de agosto y septiembre.


AVES ESTIVALES NIDIFICANTES.- Las aves estivales son aquellas que pasan el invierno en el continente africano y regresan a Europa en primavera- verano para reproducirse. Algunas de estas especies utilizan nuestra laguna para criar a sus pollos siempre que los niveles de agua sean óptimos, dado el carácter estacional de la misma.

CIGUEÑUELA (*Himantopus himantopus*)




Ave grácil de 33-37 cm de longitud y 65-82 cm de envergadura. El macho presenta el dorso y las alas negras con reflejos iridiscente, así como parte del píleo, nuca y parte posterior del cuello, todo el resto del plumaje es blanco. Las hembras tienen las partes marrones en lugar de negras y algunas carecen de este color en la zona de la cabeza. Es una de las aves más comunes y características de esta laguna como reproductora y aunque la mayoría emigran a África algunos ejemplares pueden permanecer por la zona durante el invierno.

LAVANDERA BLANCA (*Motacilla alba*)



Pájaro de 17-18 cm de longitud y 28-29 cm de envergadura. Su plumaje es gris ceniza en el dorso, las alas son negras con finas bandas blancas, la cabeza blanca con parte del píleo y nuca negros así como la garganta y parte del pecho. El resto de las partes inferiores son blancas. Especie bastante común y numerosa como invernante, también se le conoce popularmente como PIPITA.


ANDARRÍOS GRANDE (*Tringa ochropus*)



Limícola de 22-24 cm de longitud y 42-46 cm de envergadura. Sexos iguales. El plumaje de las partes superiores es pardo oscuro o marrón con listas blancas y negruzcas en la cabeza, cuello y pecho, el resto de las partes inferiores son blancas con parte de los flancos moteados o rayados de pardo. Destaca una media ceja blanca que nace del pico y muere a la altura del ojo. Invernante común aunque no numeroso con individuos que pasan aquí el verano pero sin llegar a reproducirse.


AVES SEDENTARIAS o RESIDENTES.- Las aves residentes son aquellas que se pueden ver durante todo el año por la zona. Algunas de estas especies utilizan nuestra laguna para criar a sus pollos mientras que otras la usan para alimentarse o descansar.

ÁNADE REAL o AZULÓN (*Anas platyrhynchos*)



Es el pato más abundante y popular de nuestros humedales, de 50-60 cm de longitud y 82-95 cm de envergadura. El macho tiene el dorso parduzco, el vientre grisáceo, parte trasera negra, pecho pardo separado por una fina línea blanca del verde del cuello y la cabeza. La hembra es de color pardo moteado en todo el cuerpo. Se ve durante todo el año.

ÁNADE FRISO (*Mareca strepera*)




De 47-55 cm de longitud y 78-90 cm de envergadura. El macho presenta color general grisáceo con pequeñas rayas que le da aspecto vermiculado, la parte trasera del cuerpo es negra y la cabeza y cuello gris con una llamativa línea oscura detrás de los ojos. La hembra es de tonos parduzcos con la cabeza y cuello grisáceos. Especie escasa casi siempre en parejas.

AGUILUCHO LAGUNERO OCCIDENTAL (*Circus aeruginosus*)




Ave rapaz de 45-55 cm de longitud y 115-140 cm de envergadura. El macho adulto presenta las partes superiores de color marrón con la cabeza y nuca amarillentas, finamente estriadas de negruzco y las alas tienen una banda gris. Las partes inferiores son pardas rojizas aclarándose en el pecho y garganta, también estriadas. Las hembras son en general de color pardo achocolatado con la cabeza, garganta y hombros blancos amarillentos. Se suele ver en primavera cuando parte de su población llegan de África. Se reproduce en la vecina laguna del Gobierno en Lantejuela.

FUMAREL COMÚN (*Chlidonias niger*)




De 23-29 cm de longitud y 58-65 cm de envergadura. Sexos iguales. El plumaje de los adultos en verano tiene las partes superiores de color gris oscuro con la cabeza y resto del cuerpo de color negro excepto la parte trasera del mismo que es de color gris blancuzco. Es una especie migrante que solo se ve en esta laguna en paso primaveral y en escaso número, casi siempre junto a grupos de Fumarel cariblanco.

CORLITEJO GRANDE (*Charadrius hiaticula*)



De 17-19 cm de longitud y 35-40 cm de envergadura. Plumaje de ambos sexos iguales, las partes superiores son de color pardo lo mismo que el píleo, el resto de la cabeza es blanco con una banda negra que nace en el pico y atraviesa la cara hasta la nuca, la frente también negra deja una pequeña mancha blanca encima del pico y una línea del mismo color separa el píleo del negro de la cara. Partes inferiores blancas con un ancha banda negra en la parte de arriba del pecho a modo de collar. Visitante escaso y en meses primaverales.

COMBATIENTE (*Calidris pugnax*)



De 20-30 cm de longitud y 47-60 cm de envergadura. El plumaje de invierno de ambos sexos es similar, tienen las partes superiores de color gris oscuro vermiculado, las inferiores son más claras en los flancos y blancuzcas el resto. El macho es de mayor tamaño que la hembra. Se observan pequeños grupos principalmente en el paso de primavera

GARZA REAL o GRIS (*Ardea cinerea*)



De 90-102 cm de longitud y 150-175 cm de envergadura. Su plumaje es similar en ambos sexos, en verano y el adulto tiene el dorso y alas de color gris con una mancha negra en los hombros. La cabeza y cuello son blancos con una mancha negra por encima del ojo, estas plumas son largas y forman una cresta que cuelga, el resto de las partes inferiores son blancuzcas con dos líneas de pequeñas rayas negras que bajan desde el cuello hasta el pecho. Se ve todo el año y los que se observan en verano son inmaduros no reproductores.

GARCILLA BUEYERA (*Bubulcus ibis*)




De 45-50 cm de longitud y 80-95 cm de envergadura. Sexos iguales. Plumaje de los adultos en verano es blanco en todo el cuerpo con zonas de color ocráceo en la nuca, píleo, garganta y espalda, muy llamativas en primavera-verano. Es una especie común y gregaria que utiliza la laguna para alimentarse y como dormitorio.

FLAMENCO ROSA (*Phoenicopterus ruber*)




De 125-145 cm de longitud y 140-170 cm de envergadura. El adulto en plumaje nupcial es de color totalmente blanco rosado con una mancha rosa intenso en las alas donde destacan también las plumas de vuelo de color negro. Un rasgo muy llamativo son sus largas patas de color rosa y su curvado pico, del mismo color con punta negra. Se pueden observar todo el año, aunque más abundante en primavera-verano cuando utilizan la laguna para alimentarse.

FOCHA COMÚN (*Fulica atra*)




De 36-38 cm de longitud y 70-80 cm de envergadura. Su plumaje en las partes superiores es de color negro pizarroso con la cabeza y cuello con reflejos brillante, las inferiores son también negras. Destaca el pico y el escudete frontal blancos. Es una especie común y de las más conocidas aunque no numerosa, siendo una de las especies que se reproducen de forma habitual en esta laguna.

CORRELIMOS COMÚN (*Calidris alpina*)




Limícola de 16-21 cm de longitud y 35-40 cm de envergadura. Su plumaje invernal que es el que podemos observar en esta zona, tiene las partes superiores de color grisáceo con las plumas de las alas vermiculadas, la cabeza y parte alta del pecho finamente rayadas de pardo. Las partes inferiores son blancas. Es un ave escasa que se ven solitarios o en pequeños grupos y en época invernal.

AGUJA COLINEGRA (*Limosa limosa*)




Limícola de 36-44 cm de longitud y 72-64 cm de envergadura. Sexos iguales. El plumaje de las partes superiores es gris uniforme con alas y dorso vermiculado de pardo ante y la cola negra. Las partes inferiores son blancas con el pecho y parte de los flancos franjeados de gris, en la cara presenta una media ceja blanca que acaba en los ojos. Normalmente se ven en pequeños grupos de 3-4 ejemplares y de forma ocasional, grupos de más individuos.

FUMAREL CARIBLANCO (*Chlidonias hybrida*)




De 23-28 cm de longitud y 60-70 cm de envergadura. El adulto en plumaje primaveral tiene las partes superiores de color gris con un capirote negro en la cabeza y la cara blanca en contraste con el resto de las partes inferiores gris oscuras. Por esta zona se ven en paso migratorio en el mes de abril y mayo normalmente en pequeños grupos de 6 a 10 ejemplares, pasan el invierno en África.

ANDARRÍOS CHICO (*Actitis hypoleucos*)




De 18-20 cm de longitud y 32-34 cm de envergadura. Su plumaje en las partes superiores es de color pardo, incluyendo la cabeza, cuello y parte superior del pecho, estando estos últimos finamente rayado, en la cara se aprecia una línea negruzca que atraviesa el ojo y otra blanca por encima a modo ceja, el resto de las partes inferiores son blancas. Es una especie común aunque no numerosa y que se ven en los pasos migratorios.

GALLINETA (*Gallinula ochloropus*)




De 35-38 cm de longitud y 50-55 cm de envergadura. Ambos sexos tienen el mismo plumaje. Este tiene las partes superiores marrones oscuras con tonos verdosos y oliváceos, la cabeza es negra pizarra con la nuca más azulada. Las partes inferiores son de color gris oscuro, flancos negros con manchas blancas que forma una línea discontinua, llamando mucho la atención las plumas blancas de debajo de la cola. Es una de las especies más abundantes, tanto en época de reproducción como invernante.

ZAMPULLIN CHICO o COMÚN (*Tachybaptus ruficollis*)



De 23-27 cm de longitud y 40-45 cm de envergadura. Sexos iguales. Plumaje de los adultos en sus partes superiores son de color marrón negruzco con la garganta, carrillos y parte delantera del cuello de color rojizo. Las inferiores son de color grisáceos más oscuras en los flancos y el pecho pardo. Es un ave residente y reproductora, siendo además abundante, puede realizar varias puestas en una misma temporada.

CIGÜEÑA BLANCA (*Ciconia ciconia*)




De 95-105 cm de longitud y 190-210 cm de envergadura. El adulto en plumaje nupcial es totalmente blanco con las plumas de vuelo de las alas negras, el pico y las patas de color rojo-anaranjado. Es una especie muy popular y conocida siendo fácilmente identificable. En los últimos años un buen número de cigüeñas se quedan a invernan en esta zona por lo que podemos considerarla como residente aunque en esta laguna solo acude a buscar alimento.

AVEFRÍA EUROPEA (*Vanellus vanellus*)




De 28-31 cm de longitud y 60-70 cm de envergadura. Su plumaje en las partes superiores son de color verde con reflejos iridiscentes, la cabeza tiene el píleo negro con unas plumas del mismo color a modo de cresta erectil, la cara también es negra y la nuca gris oscuro. Las partes inferiores son blancas con una ancha banda negra en el pecho y la parte posterior del cuerpo de color marrón. Es una especie común que se reproduce esporadicamente en esta laguna.

ZAMPULLIN CUELLINEGRO (*Podiceps nigricollis*)



De 29-32 cm de longitud y 55-60 cm de envergadura. Ambos sexos tienen el mismo plumaje. Este en época nupcial es de color negro en las partes superiores con unos “penachos” amarillos en la cara, los flancos y vientre de color anaranjados. Aunque es un ave sedentaria en la región, en esta laguna se ve en ocasiones y sobre todo en los desplazamientos que hacen, hacia o desde otras lagunas. Su presencia en época de reproducción posibilita su cría aunque sea de forma esporádica.

ARCHIBEBE COMÚN (*Tringa totanus*)



De 26-27 cm de longitud y 55-60 cm de envergadura. Sexos iguales. Plumaje de los adultos en sus partes superiores son de color marrón con estrías más claras, dando aspecto de vermiculado, las partes inferiores son claras muy rayadas o estriadas y con motas marrones, muy llamativas son sus patas de color naranja. Es un ave que se puede ver todo el año aunque en esta laguna lo podemos encontrar sobre todo en el paso primaveral y siempre ejemplares solitarios.

GARCILLA CANGREJERA (*Ardeola ralloides*)



De 44-46 cm de longitud y 75-85 cm de envergadura. El adulto en plumaje nupcial tiene el dorso de color pardo anaranjado con plumas más amarillentas en el píleo, en la nuca le crecen una plumas largas en forma de melena colgante, las alas son blancas. Las partes inferiores son blancas con el pecho pardo dorado. Es un ave estival que se ven desde abril, los ejemplares que se observan durante la época de cría suelen ser individuos no reproductores o inmaduros.

MARTINETE (*Nycticorax nycticorax*)



De 58-64 cm de longitud y 90-105 cm de envergadura. Su plumaje en las partes superiores son de color negro azulado-verdoso, las alas son grises y las partes inferiores son blancas incluyendo los carrillos y la frente. Tienen tres plumas largas que nacen en la nuca y le cuelgan hasta la espalda. Es un ave estival que se puede ver desde primeros de abril y los que se quedan son ejemplares no reproductores.

GAVIOTA REIDORA (*Chroicocephalus ridibundus*)



De 34-38 cm de longitud y 90-100 cm de envergadura. Ambos sexos tienen el mismo plumaje. Este tiene las partes dorsales de color gris claro con la cabeza marrón chocolate a modo de encapuchado, con el resto de las partes inferiores blancas. Es un ave residente con parejas reproductoras en años de buen nivel hídrico de la laguna. El año 2025 se estableció una colonia de cría que fue abandonada al secarse la laguna.

MORITO (*Plegadis falcinellus*)



De 56-58 cm de longitud y 90-100 cm de envergadura. Sexos iguales. Plumaje de color castaño oscuro en las partes superiores con reflejos iridiscuentes en alas, cuello y cabeza. Las partes inferiores son de color marrón oscuro casi negruzco. Un rasgo llamativo es el largo y curvado pico, que hace inconfundible a esta ave. Es una de los visitantes más numerosos de esta laguna en los últimos años, contándose cerca del centenar algunos días.


AVES DE PASO.- Son aquellas que solo se ven en los pasos migratorios de primavera y de otoño, utilizando la laguna como lugar de descanso y alimentación.

CIGÜEÑA NEGRA (*Ciconia nigra*)



De 90-105 cm de longitud y 170-200 cm de envergadura. El adulto en plumaje nupcial tiene las partes superiores, cabeza y cuello de color negro con reflejos de color verdoso, las partes inferiores son blancas con patas y pico rojo. Especie escasa y esporádica.

ESPATULA COMÚN (*Platalea leucorodia*)




De 80-93 cm de longitud y 125-140 cm de envergadura. Su plumaje nupcial es completamente blanco con un penacho en la cabeza y un collar en el cuello de color amarillento y que están formados por plumas más largas. Es un ave estival y de paso, utilizando la laguna como zona de descanso y alimentación. Algunos años se han contado hasta siete ejemplares.

GARZA IMPERIAL (*Ardea purpurea*)



De 70-78 cm de longitud y 110-145 cm de envergadura. Ambos sexos tienen el mismo plumaje. Este tiene las partes superiores grisáceas en el dorso y alas con una mancha de color pardo vinoso en los hombros, el cuello es pardo y presenta líneas longitudinales negras y blancas. Las partes inferiores son marrones. Es un ave estival que solo se ve en la zona en paso migratorio, sobre todo el primaveral.

GARCETA COMÚN (*Egretta garzetta*)



De 55-65 cm de longitud y 90-105 cm de envergadura. Sexos iguales. Plumaje de los adultos es totalmente blanco con patas y pico negros. En época de cría desarrolla unas plumas largas en la cabeza, dorso y pecho, también una zona desnuda en la cara de color amarillo. Aunque se pueden observar en cualquier época del año, es en el paso migratorio cuando es más fácil de ver en la laguna y casi siempre solitarias.